



Hôpital ophtalmique Jules-Gonin

Университетский офтальмологический центр

Фонд Убежище слепых

5143, 15 Авеню де Франс, почтовый код 5143
CH-1002 Лозанна

На страже здоровья
ваших глаз

Rôle ONCO

Отделение детской глазной онкологии

Руководитель

Доктор Кристина Статопулос,

Врач

T +41 21 626 85 80

F+41216268544

pediatrie@fa2.ch

Niréf. MU/CS/cta

Лозанна, 14 августа 2023

Natalia Kulkarni :

natalia.kulkarni@fa2.ch

Пациент Соболева Элина, 17.09.2022 – Россия
Телефон матери: 0079/538.056.772

Отчет об осмотре

Элина была повторно осмотрена под наркозом 14 августа 2023.

Диагноз:

- Двусторонняя ретинобластома группы E правого глаза и группы В1С левого глаза
- Рекомендуются генетические анализы (будут проведены в России)
- Оценка состояния после 3х курсов системной химиотерапии карбоплатином, этопозидом (1 курс - 11.1 1.22-Россия) ; (2 курс - 13.01.23; 3 курс - 10.03.23; 4 курс - 12.04.23-CHUV)
- Оценка состояния после термотерапии левого глаза OG (09.12.22, 13.01., 10.02., 11.05.23)
- Оценка состояния после диопексии левого глаза (09.12.22; 10.03.23)
- Оценка состояния после энуклеации правого глаза OD (16.12.22) : патологоанатомическое заключение : бульбовый туберкулез. Отсутствие активной ретинобластомы. Регрессирующий очаг ретинобластомы в пределах зрительного нерва на расстоянии 3.5 мм (безопасный предел 3.5 мм), с дистрофическими кальцификациями и очагами в интрасклеральных областях.
- Оценка состояния после интраартериальной химиотерапии левого глаза Мелфаланом (21.06.,19.07.23)
- MPT (14.07.23, CHUV): шишковидная железа и зрительный нерв в норме. Tumorboard (26.07.23): следующая MPT через 1 год.
- PL (13.01.23):

Операция: ESN

По поводу общего глазного статуса на данный день мы можем сделать следующие выводы.

- **Правая сетчатка:** эстетический протез на месте. Absence de déhiscence conjonctivale, d'exposition ou d'extrusion de l'implant.

➤ Левый глаз:

Внутриглазное давление: 17 мм рт.ст.

Обследование глазного дна:

Левый глаз: на глазном нерве опухоль не выявлена как при непрямой офтальмоскопии, так и при ОКТ (оптической когерентной томографии). В макулярной опухоли наблюдается уменьшение нефальсифицированной ткани на ниже-носовой стороне. Перитуморальные очаги в носовой части опухоли также уменьшились в размерах по сравнению с предыдущим контролем. Осмотр остальной области периферической сетчатки не выявил новой опухоли.

Флуоресцентная ангиография:

Рубеоз радужки отсутствует. Коронка ишемии сетчатки на 360° позади зубчатой линии. Неоваскулярных осложнений не выявлено.

Эхо В:

Левый глаз: опухолевое выпячивание оценено на 2.50 мм.

Обсуждение:

Развитие онкологического процесса благоприятно, продолжается регрессия очагов рецидива после 2-ого курса внутриартериальной химиотерапии. Таким образом, мы рекомендуем 3-ий курс внутриартериальной химиотерапии левого глаза Мелфаланом, который будет проведен 16 августа 2023 года.

Затем будет проведен новый осмотр под наркозом с целью оценить эффект терапии по прошествии одного месяца, 14 сентября 2023 года. Перед этим будет проведено ортоптическое обследование.

Dr C. Stathopoulos, MER
Врач