Три сестры

Выписной эпикриз

Дата 06.08.2025
Врач Багаутдинов Артём Рифович
Пациент Луньков Иван Сергеевич, 27.07.2014 (11 лет)
Реабилитация с 18.07.2025 по 29.08.2025
№ истории болезни: 5559

ДИАГНОЗ ПО МКБ 10

Основное заболевание: Аноксическое поражение головного мозга. Постгипокисическая энцефалопатия тяжелой степени от 15.03.2025г. вследствие механической асфиксии. Хроническое нарушение сознания. Грубая спастическая тетраплегия с формированием сгибательных контрактур. Грубый бульбарный псевдобульбарный синдром (дисфагия дизартрия) Носитель трахеостомы. Сгибательные контрактурные лучезапястных суставов, голеностопных суставов, мелких суставов обоих кистей, разгибательные контрактуры коленных суставов. . **код по МКБ:** G93.1

Сопутствующие: Дефицит витамина Д . **код по МКБ:** E55.9

Осложнения: Саркопения, латентный дефицит железа.. **код по МКБ:** M62.5

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ДИАГНОЗ ПО МКФ

	При поступлении		При выписке
Домен	ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА	Домен	ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА
b498	Функции сердечно-сосудистой, системы крови, иммунной и дыхательной систем, другие уточненные		
4.	не вертикализирован		
b710	Функции подвижности сустава		
4.	угол пассивного сгибания колен 5 град. голеностопный сустав (правая нога) в подошвенном сгибании 30 град., пассивное тыльное сгибание 25. левый голеностоп в подошвенном сгибании 50град		
b735	Функции мышечного тонуса		
4.	тонус по Эшворту в разгибателях коленного сустава 3б тонус приводящих мышц 3б		
Домен	АКТИВНОСТЬ И УЧАСТИЕ	Домен	АКТИВНОСТЬ И УЧАСТИЕ
d335	Составление и изложение сообщений в невербальной форме		
.			
d340	Составление и изложение сообщений на языке формальных символов		
.			
d5100	Мытье частей тела		
3.3	Не участвует в мытье рук и умывании лица		
e310	Семья и ближайшие родственники		
+2	Мама осуществляет уход за Иваном, [illegible]		
d570	Забота о своем здоровье		
3.3	Не поддерживает симметричную позу в течение дня		
e310	Семья и ближайшие родственники		
+2	[illegible]		

Жалобы при поступлении: не предъявляет в виду тяжести состояния.

Анамнез

Болезни: Согласно медицинской документации. 15.03.2025 около 12:00 обнаружен матерью, [illegible]е без признаков дыхания и сознания. Экстренно доставлен бригадой скорой помощью в детскую городскую клиническую больницу №9, бригада скорой помощи ребенок был заинтубирован и подключен к искусственной вентиляции легких. При выпо[illegible]мпьютерной томографии головного мозга и грудной клетки, выявлены признаки отека головного мозга,

Watermarkly

повреждении трахеи. с 15.03.2025-25.03.2025 находился на медицинской седации (5 мг/кг/час). 26.03.2025 года наложена нижняя трахеостомия. За время наблюдения состояния без очевидной динамики по неврологическому статусу - сформировал позу децеребрационной ригидности. МРТ в динамике: от 07.04.25: очаговая перивентрикулярная лейкоэнцефалопатия, стадия формирования глиоза в корковом веществе генерализованная церебральная атрофия I степени. В ходе лечения состояние стабилизировалось, нарастает объем целенаправленных движений, адаптирован к спонтанному дыханию через трахеостому (замена трахеостомы 06.06.25). Поступил в центр ранней реабилитации в клинику “Три сестры”.
Жизни: Перенесенные заболевания: ОРВИ.
Туберкулез: в анамнезе отрицает, вирусные гепатиты (A, B, C): в анамнезе отрицает. ВИЧ: в анамнезе отрицает, венерические заболевания: в анамнезе отрицает.
Вредные привычки: отрицает.
Эпидемиологический: Выездов за границу у пациента, его родственников и ближайшего окружения не было. Контактов с пациентами с лабораторно подтвержденной инфекцией CoVid-2019 не было.
Принимает препараты: Баклосан, клоназепам, леветирацетам
Вредные привычки: отрицает
Бытовые условия: удовлетворительные
Аллергологический: Не отягощен.
Наследственный: Не отягощен.

Состояние пациента

Общее состояние при поступлении: Удовлетворительное. Кожные покровы бледноватые . Отеков нет. Дыхание через трахеостому 7,0 без манжеты, последняя замена 06.06.25 (согласно медицинской документации), Аускультативно дыхание жестковатое проводится во все отделы, побочных дыхательных шумов нет, частота дыхания 22 в минуту, SpO2 95 % на воздухе. Границы сердца не расширены, тоны ясные, ритмичные, АД на правой руке 90/70 мм. рт. ст., ЧСС 94 в минуту. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень не пальпируется. Мочеиспускание не контролирует. Стул не контролирует.
Неврологический статус при поступлении: Лежит с открытыми глазами, продуктивному контакту доступен частично. Цикл сон-бодрствование сохранен. Эпизодически фиксирует взгляд, фонирует. Уровень сознания – минимальное сознание «минус».
Менингеальных знаков нет. Движения глаз в полном объеме. Слуховой. Слух сохранен. Лицо симметрично. Язык по средней линии. глоточный не вызывается. Питание через назогастральный зонд.
Грубый спастический тетрапарез с формированием сгибательных контрактур в руках и ногах. Пирамидные рефлексы повышены. Чувствительность, координацию оценить невозможно. Тазовые функции не контролирует. Полностью зависит от посторонней помощи. Нуждается в постоянном уходе. При высаживании в коляску.

Неврологический статус при выписке: Лежит с открытыми глазами, продуктивному контакту доступен частично. Цикл сон-бодрствование сохранен. Эпизодически фиксирует взгляд, фонирует. Уровень сознания – минимальное сознание «плюс».
Менингеальных знаков нет. Движения глаз в полном объеме. Слуховой. Слух сохранен. Лицо симметрично. Язык по средней линии. глоточный не вызывается. Питание через назогастральный зонд.
Грубый спастический тетрапарез с формированием сгибательных контрактур в руках и ногах. Пирамидные рефлексы повышены. Чувствительность, координацию оценить невозможно. Тазовые функции не контролирует. Полностью зависит от посторонней помощи. Нуждается в постоянном уходе. При высаживании в коляску.

Ход реабилитации

Во время реабилитации пациент получал: Медицинская процедура:
Измерение жизненно важных показателей (артериальное давление, сатурация, пульс, температура)
Услуги по уходу:
Дополнительный уход: Обработка водой и ротоканом поочередно; Перевороты в течение суток; Контроль раздачи и приема медикаментов
Запланированные цели реабилитации были достигнуты: Иван адаптирован к дыханию на заглушке до 2 часов, спонтанно глотает слюну.
Вертикализирован до 60 градусов.

Watermarkly

MAS: 4
Следующая реабилитационная цель: Иван принимает участие в поворотах

Процесс лечения

Медикаментозное лечение: Внутривенно капельно:
Натрия хлорид 250 мл, дней 3, разовая доза 250 мл
Внутривенно струйно:
Омепразол 20 мг, дней 3, разовая доза 20 мг; Кеторолак 30 мг, дней 3, разовая доза 30 мг
Внутримышечный:
Латран® 2.0 мл, дней 5, разовая доза 2.0 мл
Внутриносовой:
Олифрин 1 доза (*), дней 12, разовая доза 1 доза; Назонекс® 1 доза в каждую ноздрю, дней 7, разовая доза 1 доза; Назонекс® 1 доза, дней 10, разовая доза 1 доза
Ингаляция:
Пульмикорт® 2.0 мл через трахеостому развести 0,9% физическим раствором, дней 10, разовая доза 2.0 мл
Местный:
Акридерм ГК 1 доза обработка возле трахеостомы, дней 5, разовая доза 1 доза; Левомеколь® 1 доза обработка возле трахеостомы, дней 5, разовая доза 1 доза; Левомеколь® 1 доза Салфетка с мазью на область гастростомы, дней 7, разовая доза 1 доза
Пероральный:
Феварин® 25 мг для сопровождения (мамы), дней 10, разовая доза 25 мг; Но-шпа® 40 мг, дней 1, разовая доза 40 мг; Атаракс® 12.5 мг для сопровождения (мамы), дней 10, разовая доза 12.5 мг
Питательная трубка:
Эспумизан® бэби 15 капель, дней 1, разовая доза 15 капель ; Циклодол 2 мг, дней 4, разовая доза 2 мг; Циклодол 1 мг, дней 3, разовая доза 1 мг; Циклодол 1 мг, дней 2, разовая доза 1 мг; Циклодол 0.5 мг, дней 2, разовая доза 0.5 мг; Мальтофер® 5 мл, дней 30, разовая доза 5 мл; Микразим® 10000 ед, дней 30, разовая доза 10000 ед ; Клоназепам 1 мг, дней 30, разовая доза 1 мг; Форлакс® 4 грамма, дней 30, разовая доза 4 грамма; Леветирацетам 500 мг, дней 30, разовая доза 500 мг; Клоназепам 1 мг, дней 30, разовая доза 1 мг; Баклосан 10 мг, дней 30, разовая доза 10 мг; НОШ-БРА® 20 мг, дней 1, разовая доза 20 мг; Циклодол 1 мг, дней 7, разовая доза 1 мг; Амоксициллин+Клавулановая кислота 1200 мг, дней 3, разовая доза 1200 мг; Мальтофер® 5 мл, дней 30, разовая доза 5 мл; Микразим® 10000 ЕД, дней 30, разовая доза 10000 ЕД; Вигантол® 10 капель, дней 30, разовая доза 10 капель; Анаприлин 10 мг, дней 30, разовая доза 10 мг; Клоназепам 1 мг, дней 30, разовая доза 1 мг; Нутриком 200 мл (*), дней 30, разовая доза 200 мл; Форлакс® 4 гр, дней 30, разовая доза 4 гр; Леветирацетам 500 мг, дней 30, разовая доза 500 мг; Баклосан 10 мг, дней 30, разовая доза 10 мг; Вигантол® 10 капель, дней 30, разовая доза 10 капель; Анаприлин 10 мг, дней 30, разовая доза 10 мг; Нутриком 200 мл (*), дней 30, разовая доза 200 мл; Ибупрофен 300 мг, дней 5, разовая доза 300 мг; Мирапекс® 0.5 мг, дней 8, разовая доза 0.5 мг; Nutrien Standart 200 мл (*) розовый, 200 кал., дней 20, разовая доза 200 мл; Атаракс® 12.5 мг, дней 1, разовая доза 12.5 мг; Клоназепам 0.5 мг, дней 1, разовая доза 0.5 мг; Мирапекс® 0.25 мг, дней 10, разовая доза 0.25 мг; Клоназепам 1 мг, дней 7, разовая доза 1 мг; Донормил® 7.5 мг, дней 1, разовая доза 7.5 мг; Циклодол 2 мг, дней 20, разовая доза 2 мг; Но-шпа® 40 мг, дней 1, разовая доза 40 мг; Мотилиум® 10 мг, дней 20, разовая доза 10 мг; Нексиум® 10 мг, дней 7, разовая доза 10 мг; Клоназепам 1 мг, дней 7, разовая доза 1 мг; Клоназепам 1 мг, дней 5, разовая доза 1 мг

Рекомендации пациенту

Чтобы не потерять результаты, которых мы добились во время реабилитации, нужно выполнять рекомендации по лекарствам и занятиям.

Лечащий врач	Багаутдинов Артём Рифович	_____
Главный врач	Клочков Антон Сергеевич	_____

Watermarkly